



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



01cp 03x/jr pdt 10 jrs

2) Intetrix (Tilbroquinol + Tilquinol) : gel 300mg _____ Qsp 10jrs

02gel 02x/jr pdt 10 jrs (après la fin du traitement par métronidazole)

3) Paracétamol : cp 1gr _____ 01 boîte

01cp 03x/jr toute les 6h jusqu'à disparition de la fièvre (sans dépasser 04 cp/jr)

- **Otite moyenne aigue :**

1) Paracétamol : suppo 300mg _____ 01 boîte

01 suppo/6h jusqu'à disparition de la fièvre (sans dépasser 60mg/kg/jr)

2) SSI 0.9% en solution nasale

02 gouttes pour chaque narines/4-6h

- **PFLA**

1) Amoxicilline : cp 1gr _____ Qsp 10jrs

01cp 03x/jr pdt 10jrs

2) Paracétamol : cp 1gr _____ 01 boîte

01cp 03x/jr jusqu'à disparition de la douleur

- **Sinusite frontale**

1) Amoxicilline : cp 1gr _____ Qsp 10jrs

01cp 02x/jr matin et soir pdt 10jrs

2) Paracétamol : cp 1g _____ 01 boîte

01cp 03x/jr (sans dépasser 04g/jr)

- **Cystite :**

1) Cotrimoxazole : cp 480mg _____ Qsp 03jrs

01cp 02x/jr (sans dépasser 03cp/jr) pdt 03 jours

2) Paracétamol : cp 1g _____ 01 boîte

01cp 03x/j

- **Toxi-infection alimentaire**

1) SRO

01 sachet dans 1L d'eau après chaque selle

- **Crise de goutte**

1) Colchicine opocalcium : cp 01mg _____ 01 boîte

1er jr : 03cp /jr le matin, l'après midi et le soir

2ème jr : 02cp /jr le matin et le soir

3ème jrs : 01cp /jr le soir

2) Diclofénac : cp 50mg _____ Qsp 05jrs

01cp 02x/jr au milieu des repas , (sans dépasser 03cp/jr) pdt 05 jrs

- **Mycose vaginale :**

1) Econazole : ovule 150mg _____ 01 boîte

une seule administration, le soir au coucher

- **Impétigo chez enfant**

1) Fucidine : crème 2% _____ 01 boîte

02 app/jr pdt 07 jrs sur peau propre et sèche

2) Bétadine : solution aqueuse _____ 01 flacon

02 app/jr pdt 07 jrs

- **Acné :**

1) Peroxyde de Benzoyle : gel pour application locale _____ 01 tube

01 app/jr le soir pdt 03 mois

2) Erythromycine : gel 4% _____ 01 tube
01 app/jr pdt 03 mois

- **Colopathie fonctionnelle :**

1) Phloroglucinol : cp 80mg _____ 01 boîte
01cp 03x/jr (sans dépasser 6cp/jr)

si constipation :

2) Lactulose : sac 10g _____ Qsp 05jrs
01 à 03 sac/jr

si diarrhée :

2) Lopéramide : gel 02mg _____ Qsp 05jrs
02 gel en une seule prise, ensuite 1gel après chaque selle diarrhéique

+/- Diosmectite : sac 3g _____ 01 boîte
03 sac/jr à distance des autres médicaments de 2h

- **Migraines**

1) Paracetamol : cp 1gr _____ 01 boîte
01cp 03x/jrs espacés de 6h (sans dépasser 4g/jr)

- **Lumbago**

1) Paracetamol : cp 1g _____ 01 boîte
01cp 03x/jr espacés de 6h
2) Diclofenac : cp 50mg _____ Qsp 05jrs
01cp 02x/jr au milieu des repas pendant 05 jours
3) Tetrazepam : cp 50mg _____ Qsp 05jrs
½ cp le soir au coucher pendant 05 jours

- **Bronchite aigue :**

1) Paracetamol : cp 1gr _____ 01 boîte
01cp 03x/jrs espacés de 6h (sans dépasser 4g/jr)

- **Shigellose (diarrhée bactérienne)**

1) Cotrimoxazole : fl 240mg _____ Qsp 05jrs
07 mesures en 02 prises (04 le matin et 03 le soir)

2) Paracetamol : cp 500mg _____ 01 boîte
01cp /6h jusqu'à disparition de la fièvre sans dépasser 4g/jr

3) SRO :

01 sachet dans 1L d'eau après chaque selle liquide